

AGROCELHONE C INJECTABLE

COMPOSITION ET PROPRIETES

LIQUIDE INJECTABLE FUMIGANT AL FONGICIDE- DISINFECTANT DE SOLS

CHLOROPICRINE 164% (99,5% P/P) P/V

DENSITE 1.65 KG/L



■ CULTURES

LÉGUMES , FLEURS ET FRUITS

DOSE D'APPLICATION

200-400 KG/Ha equiv. à 121.2 - 242.4 l/Ha



■ Période de sécurité: **21 jours.**

■ Mode d'emploi: injection mécanique.

■ Preparación del suelo

- Déracinement et retrait de la culture précédente.
- Profondeur du Labour: 40-50 cm pour les cultures herbacées, 60-80 cm pour les arbres.
- Labour en surface (roto tiller).
- L'humidité du sol doit être d'environ 50 %.
- L'application peut être sur tout le terrain, en bandes alternées, ou localisées sur les lignes de plantation.

■ En application localisé dans la crête de plantation, la dose appliquée sera en gr/m2 de la surface réelle.

■ Travaux post-traitement:

- Laisser le film plastique pour au moins 12 à 14 jours pour permettre au produit d'agir complètement
- Pour le traitement du terrain entier, lorsque les films sont supprimés, labourer pour aérer le sol. Pour les applications localisées, seule la bande traitée doit être labourée

Recomendaciones

AGROCELHONE C est recommandé pour le control des maladies fongiques du sol