


AGROCELHONE CE EMULSIFIABLE

COMPOSITION ET PROPRIETES

FONGICIDE- DISINFECTANT DE SOLS

CHLOROPICRINE 94.5% (94.5% P/P) P/V

DENSITE 1.61 KG/L



■ CULTURES

LÉGUMES, FLEURS ET FRUITS

DOSE D'APPLICATION

200 - 400 KG/Ha equiv. à 125-250 l/Ha



■ Période de sécurité: **21 jours.**

■ Mode d'emploi: injection dans le système d'irrigation goutte - à - goutte

■ Préparation du sol:

- Déracinement et retrait de la culture précédente.
- Profondeur du Labour: 35-40 cm (herse à disques/ dents) - Labour en surface (roto Tillier).
- Préparation des crêtes de plantation.
- Pour les sols sableux, il est recommandé de crevasser le sol avec des lames.
- Distribution du système d'irrigation gouttes - à - gouttes sur la parcelle ou ligne de plantation (application localisées) pour les sols sableux, doubler les tuyaux de gouttes - à - gouttes (s'il s'agit d'un traitement sur tout le terrain, distribuer les lignes à 35-50 cm).
- Tester le système d'irrigation avec un court arrosage
- Isoler le sol avec un film en polyéthylène.
- Arroser pendant 3 à 4 jours pour de courtes périodes, L'humidité du sol doit être d'environ 50 à 60 % sans défaire les lignes ou parcelles de plantation (ne pas arroser un jour avant la fumigation) (pour les cultures hydroponiques : maintenir le sol humide, s'assurer que le film plastique est en bonne condition et vérifier le point de saturation du substrat).

■ En application localisé dans la crête de plantation, la dose appliquée sera en gr/m2 de la surface réelle.

■ Travaux post-traitement:

- El plástico de sellado estará expuesto al menos 12-14 días desde el día del tratamiento.
- Cuando el plástico de sellado es utilizado como acolchado, a los 12-14 días se perforará para airear el suelo, coincidiendo los agujeros con la ubicación de las plantas.
- Conveniente hacer 2-3 riegos antes de la siembra o plantación, en el último riego abrir el final de las líneas de goteros.

Recomendaciones

AGROCELHONE C est recommandé pour le control des maladies fongiques du sol