

AGROCELHONE D

AGROCELHONE VP

INJECTABLE

COMPOSITION ET PROPRIETES

**LIQUIDE INJECTABLE FUMIGANT AL
NEMATICIDE-DESINFECTANT DE SOLS**

DICHLOROPROPENE 97 P/P

DENSITE 1.2 KG/L



■ CULTURE

LÉGUMES , FLEURS ET FRUITS

DOSE D'APPLICATION

100 - 500 gr/Ha



■ Période de sécurité: **21 jours.**

■ Mode d'emploi: injection mécanique.

■ Soil preparation

- Déracinement et retrait de la culture précédente.
- Profondeur du Labour: 40-50 cm pour les cultures herbacées, 60-80 cm pour les arbres.
- Labour en surface (roto tiller).
- L'humidité du sol doit être d'environ 50 %.
- L'application peut être sur tout le terrain, en bandes alternées, ou localisées sur les lignes de plantation.

■ En application localisé sur la surface ou la ligne de plantation, la dose appliquée sera en gr/m² de la surface réelle.

■ Travaux post-traitement:

- Laisser le film plastique pour au moins 12 à 14 jours pour permettre au produit d'agir complètement.
- Pour le traitement du terrain entier, lorsque les films sont supprimés, labourer pour aérer le sol. Pour les applications localisées, seule la bande traitée doit être labourée.