

AGROCELHONE F INJECTABLE

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

LIQUIDE INJECTABLE FUMIGANT AL FONGICIDE-NEMATICIDE-DESINFECTANT DE SOLS

DICHLOROPROPENE 58% (39.5% P/P)P/V

CHLOROPICRINE 87.5% (59.5% P/P) P/V

DENSITE 1.47 KG/L



■ CULTURE

LÉGUMES , FLEURS ET FRUITS

DOSE D'APPLICATION

350 -500 KG/Ha equiv. à 245-350 l/Ha



■ Période de sécurité: **21 jours.**

■ Mode d'emploi: injection mécanique

■ Preparación del suelo

- Déracinement et retrait de la culture précédente.
- Profondeur du Labour: 40-50 cm pour les cultures herbacées, 60-80 cm pour les arbres.
- Labour en surface (roto tiller).
- L'humidité du sol doit être d'environ 50 %.
- L'application peut être sur tout le terrain, en bandes alternées, ou localisées sur les lignes de plantation.

■ En application localisé sur la surface ou la ligne de plantation, la dose appliquée sera en gr/m2 de la surface réelle.

■ Travaux post-traitement:

- Laisser le film plastique pour au moins 12 à 14 jours pour permettre au produit d'agir complètement
- Pour le traitement du terrain entier, lorsque les films sont supprimés, labourer pour aérer le sol. Pour les applications localisées, seule la bande traitée doit être labourée

Recomendaciones

AGROCELHONE F est recommandé pour le control des problèmes de maladies fongiques, même lorsque d'autres problèmes mineurs sont présents.