

AGROCELHONE N INJECTABLE


COMPOSITION ET PROPRIETES

LIQUID INJECTABLE FUMIGANT AL FONGICIDE-NEMATICIDE-DESINFECTANT DE SOLS

DICHLOROPROPENE 81.9% (61.1% P/P) P/V

CHLOROPICRINE 46.5% (34.7% P/P) P/V

DENSITE 1.34 KG/L



■ CULTURES

TABAC

OIGNONS

AUBERGINES, COURGETTES, FRAISE, RUBUS (FRAMBOISE, MÛRES), HARICOT VERT, CONCOMBRE, TOMATES, PLANTES ORNEMENTALES HERBACÉES.

DOSE D'APPLICATION

185 kg/Ha equiv. à 140 l/Ha

470-670 kg/Ha equiv. à 350-500 l/Ha

400-530 kg/Ha equiv. à 300-400 l/Ha



■ Période de sécurité: 21 jours

■ Mode d'emploi: injection mécanique.

■ Préparation du sol:

- Déracinement et retrait de la culture précédente
- Profondeur du Labour: 40-50 cm pour les cultures herbacées, 60-80 cm pour les arbres.
- Labour en surface (rototillier)
- L'humidité du sol doit être d'environ 50 %.
- L'application peut être sur tout le terrain, en bandes alternées, ou localisées sur les lignes de plantation.

■ En application localisé dans la surface ou la ligne de plantation, la dose appliquée sera en gr/m2 de la surface réelle.

■ Travaux post-traitement:

- Laisser le film plastique pour au moins 12 à 14 jours pour permettre au produit d'agir complètement
- Pour l'application du terrain entier, lorsque les films sont supprimés, labourer pour aérer le sol. Pour les applications localisées, seule la bande traitée doit être labourée.

Recommandations

AGROCELHONE N est recommandé pour le control des problèmes de nématodes et maladies fongiques, même lorsque d'autres problèmes mineurs sont présents.